

C형간염, 조기발견이 중요



거창군보건소

CONTENTS

1. 정의
2. 전파경로
3. 증상
4. 예방법
5. C형간염 검사대상자 자가체크리스트





- **C형간염바이러스에 감염되어 간에 염증을 유발하는 질병**

1. 만성간염으로 진행되는 비율이 높음.
2. 적절하게 치료하지 않을 경우 간경병증 또는 간세포암으로 진행할 수 있음.

※ C형간염 바이러스 : 상온에서 최대 3주까지 생존 가능



- 감염자의 **혈액**이나 **체액**에 의해 전파

1. 감염자 산모로부터 수직감염
2. 일회용 주사기 재사용
3. 감염자 혈액 수혈 및 장기이식
4. 성접촉, 문신, 피어싱 등

※ 식사, 포옹, 손잡기 등 일상적인 접촉이나 기침 등으로는
감염되지 않음.



■ 급성 C형간염

1. 70~80% 무증상
2. 감기 몸살 증상
3. 전신 권태감, 메스꺼움
4. 구역질, 식욕부진, 우상복부 불쾌감, 황달(약25%)
⇒ 잠복기 : 2주~6개월(평균 6~10주)

■ 만성 C형간염

1. 60~80% 무증상
2. 만성피로감
3. 간부전, 문맥압 항진증 등의 간경변증
⇒ 무증상 감염자도 전염력이 있으니 주의!

예방법



- **C형간염 검진 받기(백신 없음. 예방접종 불가능)**
- **칫솔, 손톱깎기 등 위생도구 공동사용하지 않기**
- **문신, 피어싱 등 비위생적인 시술 하지 않기**
- **치료성공률 90% 이상**

C형간염 검사대상자 자가체크리스트



- 공공장소(목욕탕, 찜질방, 네일아트점 등)에서 공용 손톱깎기 등을 사용한 적이 있다.
- 이발소, 미용실 등에서 제공하는 면도를 받은 적이 있다.
- 액세서리 판매점 등에서 피어싱(귀, 눈썹, 코 등 뚫기)을 한 경험이 있다.
- 눈썹, 아이라인, 몸 등에 문신 시술한 경험이 있다.

C형간염 검사대상자 자가체크리스트



- 의료기관 외에서 정맥주사, 주사치료 등을 받은 적이 있다.
- 의료기관 외에서 침, 부항치료 등을 받은 적이 있다.
- 혈액투석을 받고 있거나 받은 경험이 있다.
- 1991년 이전에 수혈이나 장기이식을 받은 적이 있다.
- 비고정 성파트너와 콘돔 없이 성접촉을 한 적이 있다.


⇒ 위 항목에서 “네 ” 라고 대답한 개수가 **1개 이상**이면

C형간염 검진이 필요함.



40세 이상, C형간염 검사 꼭! 필요합니다

간단한 검사로
C형간염을 진단하여
간경변증, 간암을
예방합니다



질병관리본부
KCDC

C형간염



문신, 피어싱 시술을 통해서
나도 모르게 감염될 수 있습니다.

의료행위 및 문신, 피어싱, 침술 등을 시행할 경우
일회용 또는 철저히 소독한 제품 사용

문신
피어싱
반영구화장
불법침술



질병관리본부
KCDC

감사합니다.

